



## Un potentiel de récolte estimé à 46,0 millions d'hectolitres

**S**elon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> août 2008 par le service de la statistique et de la prospective<sup>1</sup>, la récolte 2008 de vin serait inférieure de 10 % à la moyenne des cinq dernières années. Elle s'élèverait à 46,0 millions d'hectolitres, dont 23,1 en vins d'appellation (VQPRD), 13,2 en vins de pays, 3,1 en autres vins, jus et moûts, et 6,5 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

### Sommaire

<b>Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> août 2008</b>	page 2
Prévisions 2008 revues à la baisse, passant en-dessous de la faible récolte 2007	
<b>Situations régionales</b>	page 3
Mildiou mieux maîtrisé sur certains secteurs et aggravé dans d'autres en juillet	

<b>Méthodologie</b>	page 4
---------------------	--------

<b>Pour en savoir plus</b>	page 4
----------------------------	--------

<sup>1</sup> Les missions antérieurement confiées au Service central des enquêtes et des études statistiques (SCEES) sont désormais exercées par le Service de la statistique et de la prospective (SSP), conformément à l'arrêté ministériel du 30 juin 2008.

## Estimation de récolte au 1<sup>er</sup> août 2008

### Les faits marquants : Prévisions 2008 revues à la baisse, passant en-dessous de la faible récolte 2007

Selon les prévisions établies au 1<sup>er</sup> août par le SSP, la récolte 2008 s'élèverait à 46,0 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure à la moyenne des cinq dernières années de 10 %, et passerait légèrement en-dessous de la faible récolte de l'an passé. La production en vins d'appellation serait équivalente à sa valeur en 2007 et à la moyenne. Les vins de pays baisseraient de 3 % sur 2007, de 8 % sur la moyenne (baisse en Languedoc-Roussillon notamment). La récolte en vins aptes à la production de cognac serait au-dessus de 2007 (+5 %) mais resterait en-deçà de la moyenne de 21 %. La catégorie « autres vins, jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation, serait, cette année encore, en très net recul, de 41 % sur la moyenne.

L'hiver dernier a parfois manqué de rigueur pour assurer un bon repos végétatif de la vigne. L'épisode de gel du 7 avril a causé des dégâts importants en Val de Loire. Il a aussi touché les vignobles du Sud-Ouest, avec un impact plus inégal et globalement moins fort. Les mois d'avril et de mai ont été souvent très humides, favorisant l'apparition de maladies : mildiou la plupart du temps, oïdium. Le mildiou était généralement maîtrisé en juin (souvent traitements fréquents et onéreux). En juillet, la pression du mildiou était toujours forte dans certains vignobles (Dordogne,

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Beaujolais, Savoie, Gard, Sud-Est y compris la Corse), se renforçant parfois avec les nouvelles pluies de ce mois. Au contraire, la situation sanitaire s'est assainie pour d'autres secteurs qui ont connu un temps suffisamment ensoleillé en juillet (Champagne, Charentes, Gironde, Aude). Faisant suite aux mauvaises conditions de floraison au printemps, des phénomènes de coulure parfois importants contribuent aussi aux niveaux modestes de récolte prévus (Bourgogne et Beaujolais, Savoie, Charentes, Sud-Ouest y compris Bordelais, Languedoc). Des orages de grêle ont de nouveau frappé en juillet dans le Sud-Est notamment.

La végétation présentait fin juillet un retard pouvant aller jusqu'à dix jours dans le grand quart sud-est (Languedoc-Roussillon, Sud-Est, Savoie, Rhône).

Des arrachages (Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, etc.) contribuent également à modérer le potentiel de récolte annoncé pour l'automne 2008.

Pour rappel, la récolte 2007 était la plus faible enregistrée depuis au moins 2000, année 2003 de canicule incluse. Mildiou et foyers de pourriture avaient sévi fortement sur la plupart des vignobles, au cours de l'été frais et humide qui a précédé les vendanges.

### Les indicateurs : Récolte estimée à 46,0 millions d'hectolitres au 1er août 2008

#### Estimation de récolte de vins au 1er août 2008

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2007	2008	2008 / 2007	2008 / Moy (*)
Vins AOC	22 803	22 917	22 930	0%	1%
VDQS	380	289	211	-27%	-44%
Ensemble VQPRD	23 183	23 206	23 142	0%	0%
Cognac : vins aptes	8 262	6 233	6 519	5%	-21%
Vins de Pays	14 454	13 714	13 242	-3%	-8%
Autres vins, jus et moûts	5 354	3 395	3 135	-8%	-41%
<b>TOTAL VINS</b>	<b>51 253</b>	<b>46 547</b>	<b>46 037</b>	<b>-1%</b>	<b>-10%</b>


(\*) moyenne des années 2003 à 2007

Sources : Agreste, Douanes

### Mises en perspectives : La récolte 2008 serait de nouveau peu élevée, légèrement plus faible que 2007

#### Évolution de la production française par catégorie de vin

Unité : 1000 hl



Source : Agreste

## Situations régionales

### Les faits marquants : Mildiou mieux maîtrisé sur certains secteurs et aggravé dans d'autres en juillet

En **Champagne**, la floraison a bénéficié en seconde quinzaine de juin de conditions parfois fraîches et humides. L'ensoleillement de fin juillet a été favorable au développement de la vigne, et l'a assaini : mildiou (forte pluviométrie printanière) généralement bien contrôlé, oïdium limité aux secteurs sensibles.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le mildiou est globalement maîtrisé en Bourgogne ; il a reculé dans le Rhône (météo favorable en juillet) mais persiste. Des phénomènes de coulure ont été observés dans le Rhône, et en Bourgogne de façon très hétérogène.

En **Alsace**, les conditions météorologiques ont été dernièrement favorables (chaleurs modérées et pluies régulières). L'état sanitaire est bon en général (rares attaques de mildiou, oïdium marginal). Les perspectives de cette campagne sont bonnes qualitativement et quantitativement.

En **Savoie** et dans le **Jura**, la pression du mildiou est toujours présente, maîtrisée dans le Jura, mais ravivée en Savoie (nouvelles pluies début juillet). Les mauvaises conditions climatiques de floraison y ont aussi provoqué des phénomènes de coulure.

Dans le **Val de Loire**, la sortie de grappe a été faible en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Le gel du 7 avril a engendré jusqu'à 50 % de pertes en Loire-Atlantique. Des dégâts de grêle en juin ont aussi été signalés. Forte pression du mildiou en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, conditions favorables à l'oïdium en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

Dans les **Charentes**, des phénomènes de coulure (intempéries) avaient été signalés en juin en diverses

zones. Certaines parcelles (Charente) ont été endommagées par des orages de grêle. Juin, plus chaud et sec, avait été favorable à la floraison. Le retard du développement de la vigne n'a pas été rattrapé en juillet. La forte pression des maladies (surtout mildiou) s'est en revanche affaiblie avec le retour à de conditions plus sèches. On parle même de stress hydriques sur certaines parcelles.

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, les conditions froides et humides au moment de la floraison, et notamment l'épisode de gel du 7 avril, ont provoqué de la coulure en diverses zones du Gers, Dordogne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. La floraison a été très hétérogène en Gironde, où la pression des parasites est maîtrisée. La pression du mildiou reste forte en Dordogne (impact réel sur la récolte).

En **Languedoc-Roussillon**, le potentiel de production est structurellement amoindri (arrachages). L'état sanitaire s'est encore dégradé en juillet dans le Gard, avec des orages de grêle destructeurs. De même, dans l'Hérault, le mildiou est parfois monté d'un cran en virulence. L'état sanitaire s'est amélioré dans l'Aude, où les pluies de juillet ont fait grossir les grains dans certains secteurs. De la coulure est globalement signalée. Les vignes des Pyrénées-Orientales présentent actuellement un bon état sanitaire.

Les **autres vignobles du Sud-Est** sont touchées pleinement par le mildiou, plus modérément par de la coulure. Nouveaux dégâts de grêle en Ardèche et Drôme début juillet. En **Corse**, les pluies abondantes du printemps ont induit de fortes attaques de mildiou en Haute-Corse.

### Les indicateurs : Prévisions 2008 revues à la baisse dans la plupart des vignobles (mildiou, coulure, ...)

#### Estimation de récolte par vignoble (\*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy
Champagne	2 800	2 994	3 041	2%	9%	2 546	2 966	2 982	1%	17%
Bourgogne - Beaujolais	2 670	2 625	2 619	0%	-2%	2 530	2 504	2 494	0%	-1%
Alsace	1 176	1 205	1 225	2%	4%	1 133	1 159	1 179	2%	4%
Savoie	131	118	120	2%	-9%	109	96	99	3%	-9%
Jura	96	102	95	-7%	-1%	88	93	87	-6%	-1%
Val de Loire	3 473	3 092	2 561	-17%	-26%	2 548	2 411	2 069	-14%	-19%
Charentes	8 624	6 490	6 772	4%	-21%	68	53	55	4%	-19%
Sud-Ouest	3 687	3 064	3 139	2%	-15%	1 338	1 210	1 294	7%	-3%
Bordelais	6 398	5 932	5 988	1%	-6%	5 983	5 701	5 900	3%	-1%
Languedoc-Roussillon	16 087	14 657	14 353	-2%	-11%	3 112	3 046	3 117	2%	0%
Corse	365	337	368	9%	1%	115	113	118	5%	3%
Autres vignobles Sud-Est	5 937	5 740	5 606	-2%	-6%	3 657	3 591	3 562	-1%	-3%

(\*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(\*\*) moyenne des années 2003 à 2007

Source : Agreste

## Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2008 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2007.

**Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :**  
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

## Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



## Agreste : la statistique agricole

**Ministère de l'Agriculture et de la Pêche**  
**Secrétariat Général**

**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007  
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directeur de la publication : Philippe Bonneau

Rédacteur : Géraldine LABARTHE

Composition : SSP

Dépôt légal : à parution

ISSN : 1274 – 1051

© Agreste 2008

**Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole**

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)