



Un potentiel de récolte estimé à 44,4 millions d'hectolitres

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre¹ 2008 par le service de la statistique et de la prospective, la récolte 2008 de vin serait inférieure de 13 % à la moyenne des cinq dernières récoltes. Ce recul par rapport à la moyenne concernerait la totalité des régions à l'exception de la Champagne et de l'Alsace. La production s'élèverait à 44,4 millions d'hectolitres, dont 22,3 en vins d'appellation (VQPRD), 12,1 en vins de pays, 2,8 en autres vins, jus et moûts, et 7,2 pour les vins aptes à l'élaboration du cognac.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2008	page 2
Prévisions 2008 revues à la baisse une nouvelle fois	
Situations régionales	page 3
Les premiers volumes récoltés confirment des rendements souvent faibles	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

¹ Ces estimations résultent d'enquêtes de conjoncture menées par les Services Régionaux de l'Information Statistique et Économique (SRISE) du Ministère de l'Agriculture, durant la quinzaine précédant la date de référence : les estimations au 1^{er} octobre 2008 s'appuient sur les enquêtes de conjoncture menées par les SRISE durant la seconde quinzaine de septembre.

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2008

Les faits marquants : Prévisions 2008 revues à la baisse une nouvelle fois

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre par le SSP, la récolte 2008 s'élèverait à 44,4 millions d'hectolitres. Elle serait inférieure de 13 % à la moyenne des cinq dernières années, et plus faible que la récolte déjà basse de l'an passé de 5 %. Quelle que soit la catégorie, toutes les productions de vin seraient inférieures à la moyenne au niveau national : - 4 % pour les vins d'appellation, - 12 % pour les vins aptes à la production de cognac, - 16 % pour les vins de pays, et - 48 % pour la catégorie « autres vins, jus et moûts », où sont entre autres comptabilisés les volumes au-dessus des plafonds d'appellation.

L'hiver dernier a parfois manqué de rigueur pour assurer un bon repos végétatif de la vigne. L'épisode de gel du 7 avril a causé d'importants dégâts en Val de Loire. Il a aussi touché les vignobles du Sud-Ouest, avec un impact plus inégal et globalement moins fort. Les mois d'avril et de mai ont été souvent très humides, favorisant l'apparition de maladies : mildiou la plupart du temps, oïdium. Le mildiou était généralement maîtrisé en juin, souvent au prix de traitements fréquents et onéreux. Mais en juillet, la pression du mildiou était toujours forte dans certains vignobles (Dordogne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Beaujolais, Savoie, Gard, Sud-Est y compris la Corse), se renforçant parfois avec les nouvelles pluies de ce mois. Au contraire, le vignoble s'est assaini pour d'autres secteurs qui ont connu un temps suffisamment ensoleillé

en juillet (Champagne, Charentes, Gironde, Aude). Faisant suite aux mauvaises conditions de floraison du printemps, des phénomènes de coulure parfois importants contribuent aussi aux niveaux modestes de récolte prévus (Bourgogne et Beaujolais, Savoie, Charentes, Sud-Ouest, Gard et Aude). En juillet toujours, des orages de grêle ont frappé le Sud-Est notamment ; ce phénomène climatique a sévi encore en août et septembre, dans le Beaujolais violemment, le Maconnais, l'Ardèche, la Drôme et l'Hérault. Les premières vendanges ont débuté fin août dans le Sud, dans de bonnes conditions. Un retard de végétation était toujours constaté fin août, notamment dans diverses zones de la moitié Sud de la France, avec jusqu'à plus de quinze jours de retard dans le Sud-Ouest. En septembre, dans la moitié nord (Val de Loire, Bourgogne), le temps frais, sec et ensoleillé a permis de stopper le botrytis ; dans le quart sud-est, les pluies ont eu des effets perturbateurs (maturation ralentie, état sanitaire dégradé, vendanges perturbées). Des arrachages dans le Languedoc-Roussillon et le Sud-Ouest notamment contribuent aussi à modérer le potentiel de récolte annoncé pour 2008.

Pour rappel, la récolte 2007 était la plus faible enregistrée depuis au moins 2000, année 2003 de canicule comprise. Mildiou et foyers de pourriture avaient sévi fortement sur la plupart des vignobles, au cours de l'été frais et humide qui a précédé les vendanges.

Les indicateurs : Récolte estimée à 44,4 millions d'hectolitres au 1er octobre 2008

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2008


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2007	2008	2008 / 2007	2008 / Moy (*)
Vins AOC	22 803	22 917	22 024	-4%	-3%
VDQS	380	289	241	-17%	-37%
Ensemble VQPRD	23 183	23 206	22 265	-4%	-4%
Cognac : vins aptes	8 262	6 233	7 241	16%	-12%
Vins de Pays	14 454	13 714	12 142	-11%	-16%
Autres vins, jus et moûts	5 354	3 395	2 781	-18%	-48%
TOTAL VINS	51 253	46 547	44 429	-5%	-13%

(*) moyenne des années 2003 à 2007

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : La récolte 2008 serait peu élevée et encore plus faible que 2007



Situations régionales

Les faits marquants : Les premiers volumes récoltés confirment des rendements souvent faibles

En **Champagne**, les conditions de floraison ont parfois été fraîches et humides. Le soleil de fin juillet a aidé au développement de la vigne et l'a assaini. Pas de botrytis ni de pourriture. Les vendanges ont bénéficié de conditions optimales en septembre, favorisant encore la qualité. Le rendement butoir de 15 500 kg / ha ne sera pas atteint.

En **Bourgogne et Beaujolais**, le temps froid sec et ensoleillé de septembre a contenu le risque de pourriture grise en Bourgogne et y a favorisé la maturation du raisin. Dans le Rhône, le potentiel est limité (mildiou, grêle, botrytis) ; le temps frais et ensoleillé durant les vendanges a été très favorable à la qualité.

En **Alsace**, les conditions météorologiques ont été favorables cet été. Bon état sanitaire. Les vendanges ont débuté mi-septembre (crémant) dans de bonnes conditions climatiques (pourriture grise limitée). Celles de vin tranquille ont été retardées (maturité).

En **Savoie**, forte pression du mildiou, coulure et parcelles grêlées font attendre de faibles volumes. Dans le **Jura**, les premières vendanges font revoir le potentiel à la baisse (mildiou, pourriture). La météo de fin septembre est favorable à la qualité (Jura et Savoie).

Dans le **Val de Loire**, la sortie de grappe a été faible en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Le gel puis la grêle en juin ont affecté le vignoble. Le botrytis a été stoppé par une arrière-saison plutôt favorable en Loire-Atlantique et Vendée ; l'état sanitaire est bon dans la Nièvre grâce au temps frais. La maturation évoluait toujours lentement en septembre dans le Maine-et-Loire, avec un potentiel qualitatif bien préservé. En Loire-Atlantique, le beau temps de seconde quinzaine de septembre a permis une bonne fin de maturation.

Dans les **Charentes**, des phénomènes de coulure ont été signalés en juin ; la fin du mois chaud et sec a été plus favorable à la floraison. Des orages de grêle ont fait des dégâts locaux en Charente. Sur la fin pour les cépages chardonnays et sauvignons, les vendanges démarrent vraiment début octobre en ugni blanc, sans tarder du fait de la pression sanitaire (botrytis, cicadelles vertes).

Dans le **Sud-Ouest** y compris le **Bordelais**, froid et humidité pendant la floraison et gel du 7 avril ont provoqué de la coulure. En Dordogne, faible nouaison et forte pression du mildiou (impact réel sur récolte) sont constatés. On parle de qualité dans le Gers et le Lot. En Gironde, l'impact de la floraison hétérogène sur les rendements se confirme, avec un état sanitaire maîtrisé. Le temps sec et ensoleillé de septembre a été favorable en Aquitaine, mais a limité les rendements sur cépages blancs dans le Tarn.

En **Languedoc-Roussillon**, le potentiel de production est structurellement amoindri. La récolte 2008 est de plus touchée par de la coulure (Aude, Hérault, Gard), des orages de grêle destructeurs, un déficit hydrique estival (Roussillon, Aude) et des problèmes sanitaires maîtrisés en septembre. Les premières vendanges ont débuté le 20/08 dans de bonnes conditions. La pluie tombée en septembre a souvent ralenti la maturation et peu favorisé le développement des baies. Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, forte pression sanitaire (mildiou, oïdium), coulure, sécheresse estivale (Sud) et pluies de début septembre par endroit ont affecté les volumes. Sérieux dégâts de grêle en août en Ardèche et Drôme, en plus d'épisodes déjà enregistrés dans le Sud-Est. En **Corse**, le printemps pluvieux a induit de sérieux problèmes sanitaires (perte de rendement conséquente).

Les indicateurs : Prévisions 2008 revues de nouveau à la baisse, notamment dans le Languedoc-Roussillon

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2008 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Vins AOC				
	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy	Moy (**)	2007	2008	2008/2007	2008/Moy
Champagne	2 800	2 994	2 963	-1%	6%	2 546	2 966	2 934	-1%	15%
Bourgogne - Beaujolais	2 670	2 625	2 494	-5%	-7%	2 530	2 504	2 392	-4%	-5%
Alsace	1 176	1 205	1 223	1%	4%	1 133	1 159	1 173	1%	4%
Savoie	131	118	113	-4%	-14%	109	96	95	-1%	-13%
Jura	96	102	88	-14%	-9%	88	93	80	-14%	-9%
Val de Loire	3 473	3 092	2 601	-16%	-25%	2 548	2 411	2 064	-14%	-19%
Charentes	8 624	6 490	7 494	15%	-13%	68	53	55	4%	-19%
Sud-Ouest	3 687	3 064	3 084	1%	-16%	1 338	1 210	1 258	4%	-6%
Bordelais	6 398	5 932	5 635	-5%	-12%	5 983	5 701	5 550	-3%	-7%
Languedoc- Roussillon	16 087	14 657	13 016	-11%	-19%	3 112	3 046	2 926	-4%	-6%
Corse	365	337	287	-15%	-21%	115	113	96	-15%	-17%
Autres vignobles Sud-Est	5 937	5 740	5 291	-8%	-11%	3 657	3 591	3 426	-5%	-6%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2003 à 2007

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2008 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Elles sont établies à dire d'experts pour la campagne en cours. Pour les résultats dits définitifs de la campagne précédente, elles sont établies à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI et publiées au journal officiel. La prise en compte des plafonds étant de rigueur dans ce travail, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflor ex Onivins) et l'INAO apportent l'information sur ces réglementations.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 41 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne - Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Nièvre (58), Deux-Sèvres (79), Vendée (85)

La production de l'ensemble de ces départements représente 99 % de la production nationale en 2007.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri ROL-TANGUY TSA 70007
93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Géraldine LABARTHE
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274 – 1051
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)